Внимательно прочитайте эту брошюру перед использованием!
Не выбрасывайте эту листовку. Возможно, вам понадобится прочитать ее еще раз. Если у вас есть дополнительные вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом. Это лекарство было предписано лично для вас, и вы не должны давать его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если у них есть симптомы заболевания схожего с вашим.

ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл

суспензия для перорального применения
Нифуроксазид

BOSNALIJEK

СОСТАВ
5 мл **ЭНТЕРОФУРИЛ** ® пероральная суспензия содержит: 200,0 мг нифуроксазида
Вспомогательные вещества: сахароза, этанол 96% (1% w/v), карбомер, метилпарагидроксибензоат, гидроксид натрия, обезвоженная лимонная кислота, аромат банана, очищенная вода.
Каждая твердая капсула содержит: Нифуроксазид 200,0 мг

Лекарственная форма и упаковка
ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения это плотная, желтая суспензия с банановым запахом.
Флакон содержит 90 мл суспензии для перорального применения (200 мг / 5 мл) в комплекте пластиковой мерной ложкой 2.5 мл/5мл помещены в пачке.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
ЭНТЕРОФУРИЛ ® суспензия для перорального применения относится к группе лекарств действующих против возбудителей диареи, под названием "антидиарейные и лекарственные средства с противовоспалительным и антиинфекционным эффектом ".

Производитель и его адрес
АО “Босниалек”,, фармацевтическая и химическая промышленность, акционерное общество, Сараево, Юкичева 53, Босния и Герцеговина

МЕСТО И РЕЖИМ ВЫПИСКИ
Доступен по рецепту врача.

1.Что представляет из себя ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения и для чего он предназначен?
ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения содержит нифуроксазид, действуя исключительно в кишечнике на возбудителей диареи. Предполагается, что он действует, будучи связан в тельцах возбудителей диареи (бактерии и паразиты) безвозвратно останавливая их рост и развитие, и, таким образом уменьшая частоту развития диареи. Грамположительные кокки, особенно чувствительные к этому препарату: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus pyogenes, а из грамотрицательных энтеробактерий: кишечная палочка, сальмонеллы и шигелла. Препарат остается в кишечнике в течении достаточно длительного периода времени, что зависит от введенного объема препарата и моторики кишечника. Нифуроксазид и его метаболиты полностью выводятся через фекалии.

ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения используется в случаях:
- Диарея индуцированная пищевыми инфекциями и отравлениями у детей и взрослых, особенно вызванными кишечной палочкой;
- Хроническая диарея при колитах;
- Кишечные ферментативные расстройства;
- Острые и хронические диареи неясной этиологии, но без инвазивных процессов;
- Ятрогенные диареи, вызванные принятием антибиотиков;
- Симптоматические диареи при опухолях толстой кишки;
- Некоторые формы острого приступа кровотечения прямой кишки инфекционного генеза;
- Профилактика диареи путешественников.

2.**Что вы должны знать, прежде чем начать пользовать ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения?**
Предупредите своего врача, если вы принимаете другие лекарства, имеете хронические заболевания, расстройства обмена веществ, при индивидуальной непереносимости на лекарства или перенесенные аллергические реакции на некоторые из лекарственных средств.

Когда вы не должны использовать ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензию для перорального применения?
Не применять **ЭНТЕРОФУРИЛ ®** 200 мг / 5 мл суспензию для перорального применения :
- В случае индивидуальной непереносимости нифуроксазида и / или эксципиентов;
- У недоношенных детей и детей в возрасте до одного месяца.

Предупреждения и меры предосторожности
При лечении диареи нифуроксазидом, необходимо принимать большее количество жидкости в организме, с целью компенсации воды и минеральных веществ потерянных из за диареи.
В зависимости от вашего клинического состояния и частоты диареи, компенсация жидкости проводится путем принятия раствора электролитов внутрь (оральная солевая регидратация), а также с помощью вливания в случаях большой потери жидкости.
Потребление алкоголя во время принятия **ЭНТЕРОФУРИЛ ®** 200 мг / 5 мл суспензии для перорального применения строго запрещено, из-за возможности появления дисульфирамового синдрома, который проявляется в виде головной боли, рвоты и тошноты.
Этот препарат не следует применять пациентам с непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции или синдромом дефицита сахарозы-изомальтозы.

Вы должны быть осторожны, если одновременно принимаете другие лекарства

Пожалуйста, имейте в виду, что эта информация действительна, если вы не принимаете больше другие лекарства, а также если вы не планируете использовать их в будущем. Сообщите вашему врачу, если вы принимаете, или недавно принимали другие лекарства, в том числе лекарства, которые доступны без рецепта врача.
Не известно взаимодействует **ЭНТЕРОФУРИЛ** ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения с другими лекарствами или нет.

Применение ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензии для перорального применения во время беременности и в период лактации
Перед началом использования лекарства, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом.

Нет никаких данных, которые указывают на возможные вредные последствия для плода, но, тем не менее, применение нифуроксазида не рекомендуется во время беременности.
Нифуроксазид не всасывается из желудочно-кишечного тракта, так что нет возможности его выделения с грудным молоком, и он может применятся в период кормления грудью.

Влияние ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензии для перорального применения на способность управлять автомобилем и управлением машин
ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения никак не влияет на способность управлять автомобилем и управление машинами.

3.Как применяется ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения?
Пожалуйста, принимать этот препарат в соответствии с предоставленным листком вкладышем.
Если вы думаете, что действие препарата является слишком сильным или слишком слабым, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Дозировка
Для дозирования используется ложка дозатор 5 мл, которая имеет деления по 2,5 мл.
Суспензию нужно хорошо встряхнуть перед использованием.
Дети в возрасте от 1 до 6 месяцев: 2,5 мл для введения 2 до 3 раз в день.
Детям в возрасте от 7 месяцев до 2 лет: 2,5 мл 4 раза в день.
Детям в возрасте от 3 до 7 лет: 5 мл 3 раза в день.
Взрослым и детям старше 7 лет: 5 мл 3 4 раза в день (всего 600-800 нифуроксазид день).

Примечание:
Терапия с нифуроксазидом не должна длиться дольше чем 7 дней, хотя применение препарата может быть продлено, если есть необходимость продления терапии, взависимости от клинического состояния пациента.
Во время применения **ЭНТЕРОФУРИЛ ®** 200 мг / 5 мл суспензии для перорального применения должен быть введен специальный режим диеты, который будет включать в себя рис и мясо на гриле, а также исключать из рациона молочные продукты, фрукты, зеленые овощи, острую пищу и холодные напитки.

Что будет если вы приняли большее количество лекарства, чем должны были
Если вы приняли большее количество лекарства, чем предписано, немедленно проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом!

Нет никаких сведений о передозировке препарата.

Если вы забыли принять лекарство
Если вы забыли принять лекарство, не принимайте двойную дозу препарата впоследствии, но продолжайте принимать препарат в соответствии с обычным графиком.

Если вы забыли принять лекарство, примите упущенную дозу как можно скорее, и продолжайте согласно обычному графику.

Если вы вдруг прекратите использовать это лекарство
Пожалуйста, используйте это лекарство, как прописал вам врач.

Если вы вдруг перестанете принимать это лекарство, никаких негативных последствий не ожидается. В любом случае, мы рекомендуем вам придерживаться терапевтического режима, и, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом о прекращении терапии, если это необходимо.

4.**Возможные негативные последствия**
Как и другие лекарственные средства, **ЭНТЕРОФУРИЛ ®** 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения может вызывать определенные побочные действия.

ЭНТЕРОФУРИЛ ® 200 мг / 5 мл суспензия для перорального применения очень хорошо переносится, и вызывает аллергические реакции крайне редко.

В случае непереносимости или аллергической реакции на **ЭНТЕРОФУРИЛ ®** 200 мг / 5 мл пероральной суспензии, ее применение должно быть немедленно прекращено.

Рекомендуется, сообщять врачу или фармацевту как можно скорее о всех реакциях, вызванных препаратом

ХРАНЕНИЕ
Не хранить при температуре выше 30 ° С. Не замораживать!
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок действия
Указан на упаковке.
Препарат не следует использовать после истечения срока годности.