

НИСТАТИН вагинальные суппозитории

Состав препарата

1 вагинальный суппозиторий содержит:

Активное вещество: нистатин 250 000 ЕД или 500 000 ЕД.

Вспомогательные вещества: бутилоксанизол, бутилокситолуол, лимонная кислота, вазелиновое масло, полусинтетические глицериды – до 2,0 г.

Описание препарата

Вагинальные суппозитории цилиндрической формы, желтого цвета. На срезе допускается наличие воздушного, пористого стержня и воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа и код АТХ

Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний. Антибиотики.

Код АТХ:G01 AA01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Полиеновый противогрибковый антибиотик, высокоактивный в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*. Оказывает фунгистатическое действие. В отношении бактерий неэффективен.

Механизм действия. В структуре антибиотика имеется большое количество двойных связей, обуславливающих высокую тропность вещества к стеролам цитоплазматической мембраны грибов, что способствует встраиванию молекулы препарата в мембрану клетки с образованием множества каналов, способствующих неконтролируемому транспорту воды, электролитов и неэлектролитов. Клетка теряет устойчивость к воздействию внешних осмотических сил и гибнет.

Толерантность развивается очень медленно.

Фармакокинетика

При местном применении практически не всасывается через слизистые оболочки.

Показания

Вагинальный кандидоз; профилактика грибковых осложнений при длительной противомикробной терапии (включая интравагинальную).

Способ применения и дозы

Интравагинально, взрослым обычно назначают по 250000 ЕД - 500000 ЕД 2 раза в день (утром и вечером после гигиенических процедур). Продолжительность курса лечения 10-14 дней.

Побочные действия

Местные реакции: редко – раздражение слизистой влагалища, аллергические реакции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, первый триместр беременности.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Меры предосторожности и особенности применения

Во время менструации лечение не следует прерывать.

В период лечения рекомендуется избегать половых контактов.

С целью предотвращения реинфекции рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Беременность и период лактации

Применение препарата во II и III триместрах беременности и в период лактации возможно в случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортом или другими потенциально опасными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарствами, другие взаимодействия

При одновременном применении нистатина и клотримазола активность последнего снижается.

Форма выпуска, упаковка

По 5 вагинальных суппозитория в блистере из ПВХ/ПЭ пленки.

По 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить в сухом и защищенном от света месте, при температуре 15-25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускать без рецепта врача.